



**Braškių daigai**  
iš Šiaurės Vokietijos





„**Kaack Pflanzenvermehrung**“ – tai vidutinio dydžio šeimos įmonė, auginanti ir platinanti braškių bei pakalnučių daigus. Mes jau 30 metų dauginame vertingus Frigo braškių daigus.

Braškių daigai auga mūsų smėlingoje dirvoje švelniame, drėgname klimate Šlėzvigo-Holšteino žemės širdyje. Mūsų stiprybė – tai ilgametė patirtis braškių dauginime, jaunas darbo kolektyvas ir daugybė naujovių. Mūsų klientai vertina mūsų braškių daigų kokybę, sėkmingą bendradarbiavimą ir malonų bendravimą.

Augindami daigus, mes labai rūpinamės jų kokybe. Mūsų įmonė pati išvystė daigų auginimo techniką ir tam mes teikiame labai didelę reikšmę. Nuėmus grūdinių kultūrų derlių, mes išsirenkame plotus sekančiam sezonui ir juose tikriname, ar dirva neužkrėsta *Verticilium* genties grybais. Iš karto po to mes kaip tarpinę kultūrą sėjame serenčius, kad sumažintume nematodų kiekį ir pagerintume dirvos sudėtį.

Daigus mes auginame pagal Vokietijos braškių dauginimo įmonių susivienijimo kokybės nuostatas. Nepriklausomi Šlėzvigo-Holšteino Žemės ūkio rūmų kontrolieriai keletą kartų per sezoną tikrina, ar laikomasi nurodymų. Tiek elitiniai motininiai augalai, tiek ir nuimti Frigo daigai tikrinami dėl įvairių ligų ir kenkėjų. Tai pat vertinamas daigų išrūšiavimas pagal jų išrovimą.




Visas mūsų siūlomas rūšis mes taip pat sodiname, laukiame uogų derliaus ir tikriname, kokiam pardavimui ir sodinimo metodams jos tinka.

**Mūsų braškių daigai – tai garantuota aukščiausia kokybė iš Šiaurės Vokietijos!**

Mūsų klientai yra mūsų partneriai, todėl mes lanksčiai reaguo-  
jame į Jūsų pageidavimus.







## Gamyba (auginimas)

### Kviečiame trumpai susipažinti su mūsų darbu:

Labai svarbu išsirinkti tinkamą dirvą daigų dauginimui. Siekiant pagerinti dirvos sudėtį ir sumažinti nematodų kiekį, likus metams iki dauginimo, dirvoje sėjami serenčiai (1).

Antrą pavasarį sodinami elitiniai motininiai daigai, kurie išleis ūglius. Lauko laistymas gerina augimą (2).

Piktžolės daugiausiai naikinamos mechanškai arba kultivatoriumi, o reguliarus apipurškimas fungicidais bei lapų trąšomis stiprina augalus ir leidžia jiems augti sveikiems (3).

Augalai dauginimo lysvėje sodinami tam tikru atstumu. Tai priklauso nuo augalų rūšies, auginimo vietos ir būdo. Ūgliai sodinami rankomis taip, kad jie lengviau prigytų ir turėtų daug erdvės (4).

Kai daigai pakankamai gerai įsišaknija, iki tol labai rūpestingai prižiūrėti motininiai augalai apakėjami. Ši priemonė daigams yra labai svarbi, kad per likusį vegetacinį laikotarpį jie gautų pakankamai šviesos ir galėtų kaupti asimiliacijos produktus (5).

Stiprių daigų užauginimui reikia geros intuicijos: tinkamu metu turi būtų apkarpomi lapai, o ūgliai paskirstomi dauginimosi lysvėse (6).

Daigai iš dauginimo lysvės išraunami mašinomis. Pačių sukurta technika leidžia nuimti derlių net ir sunkiausiomis sąlygomis (7).


Kompetetingi ir patyrę darbuotojai iš to paties regiono bei iš užsienio išrūšiuoja ir supakuoja daigus (8).

Augalai sandėliuojami mūsų šaldymo patalpose iki -2 °C, kol bus išvežti klientams arba klientai atsiims juos patys (9).





# Mūsų siūlomų braškių rūšių derliaus indeksas\*





\*Derliaus indeksas apskaičiuojamas pagal braškių kiekį derliaus pradžioje ir įpusėjus derliaus nuėmimui Fulendorfo kaime.



Labai ankstyvos

## Clery





**Uogos:** nuo raudonos iki vidutinio tamsumo raudonos spalvos, subalansuotas skonis, pakankamai tvirtos  
**Sunokimo laikas:** 7-11 dienų anksčiau, nei Elsanta veislės braškės  
**Augalas:** vidutiniškai greitai auga, gerai pakelia šaltį, didelis derlius  
**Veislę išvedė:** M. Leis, A. Martinelli, G. Castagnoli, Italija

Be sėjomainos



Labai ankstyvos

## Daroyal®



**Uogos:** nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, salsvas skonis, pakankamai tvirtos  
**Sunokimo laikas:** 7-11 dienų anksčiau, nei Elsanta veislės braškės  
**Augalas:** greitai auga, atsparus, ilgi žiedkočiai, atsparus Verticilium genties grybams, tinka **organinei sodininkystei**  
**Veislę išvedė:** Darbonne – Innotalis, Le Barp, Prancūzija  
**Tėvai:** Elsanta x Parker, 2006 m.

Be sėjomainos



# Honeoye



**Uogos:** nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, vidutinio dydžio, šiek tiek rūgštelėjęs skonis, linkusios tamsėti, skinti mažais atstumais

**Sunokimo laikas:** 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** lėtai auga, žiedai po lapais dalinai apsaugoti nuo vėlyvų šalnų, neatsparus fitoftorai C ir Verticilium genties grybams

**Veislę išvedė:** Cornell University New York, Jungtinės Amerikos Valstijos

**Tėvai:** Vibrant x Holiday, 1979 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Rumba



**Uogos:** nuo šviesiai raudonos iki vidutinio tamsumo raudonos spalvos, vienodos formos, blizgančios, subalansuotas skonis

**Sunokimo laikas:** 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės

**Augalas:** ilgi žiedai, auga greitai, atsparus žiemai

**Veislę išvedė:** Fresh Forward Holding B. V., Nyderlandai

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Ines 5 žvaigždučių aromatas iš šiltnamio!



**Uogos:** vidutinės ir didelės, ryškiai raudonos spalvos, blizgančios, **labai kvepiančios**, plačiai išsiskleidę taurėlapiai, tvirtos, tačiau šiek tiek linkusios tamsėti, galima dažnai skinti!

**Sunokimo laikas:** 4-6 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** auga vidutiniškai greitai, nereikia parišti, dideli šviesoki lapai, neatsparus fitoftorai C, tačiau atsparus Verticilium genties grybams ir braškių miltligei, anksti pražysta, Ines mėgsta šiek tiek rūgščių dirvą, kurioje daug mikroelementų

**Veislę išvedė:** H. Frantz, 2010 m., Vokietija

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri



Ines tarp kitų substrate auginamų braškių veislių išsiskiria tuo, jog ši veislė anksti sunoksta, o uogos ypač aromatingos ir tvirtos.

## Ines – tai aukščiausios kokybės braškės!

Ines duoda ypač didelį derlių, tačiau labai jautriai reaguoja į neteisingai paskirstytas azotines trąšas vasaros pabaigoje.

## Ines verta auginti laukuose, kur pirkėjai patys nusiskina uogas, bei šiltnamiuose!

Galimas 2 metų auginimas šiltnamyje, paliekant neišskabytą vainikėlį.

Dėl aukščiau lapų esančių žiedynų ir palyginus su kitomis braškių veislėmis labai ankstyvo žydėjimo, nerekomenduojame dengti agroplėvele. (Vėlyvų šalnų rizika)



## Lambada



**Uogos:** ryškiai raudonos spalvos, vidutinio dydžio, sultingos, saldžios

**Sunokimo laikas:** 3-5 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** auga statmenai, turi nedaug ilgų žiedkočių, neatsparus Verticilium genties grybams ir braškių miltligei (tiek augalai, tiek ir uogos!)

**Veislę išvedė:** Plant Research International B. V., Wageningen, Nyderlandai

**Eltern:** (Sivetta x Holiday) x (Karina x Primella), 1996 m.



### Be sėjomainos



## Deluxe Geriausia kokybė, tinka tiesioginiam pardavimui!



**Uogos:** blizgančios, didelės, apvalios, gero skonio uogos, tarp jų dauguma 1 klasės

**Sunokimo laikas:** 1-2 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės


**Augalas:** auga statmenai, turi ilgus žiedkočius, **galima greitai priskinti didelį kiekį uogų**, didelis derlius gaunamas net ir antraisiais metais, atsparios kekerui, Verticilium genties grybams ir miltligei

**Veislę išvedė:** Veislę išvedė: Darbonne-Innotalis, Le Barp, Prancūzija

**Tėvai:** Elsanta x Parker, 2012 m.



### Be sėjomainos



## Darselect




**Uogos:** šviesiai ir vidutiniškai šviesios raudonos spalvos, didelės, subalansuoto skonio, ilgai išsilaiko šviežios, nemėgsta lietaus, tačiau atsparios karščiui

**Sunokimo laikas:** 3-5 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės


**Augalas:** labai išsikerija, žiedai virš lapų (vėlyvų šalų pavojus), reikalauja daug vandens, gana atsparus fitoforai C ir kekerui, neatsparus Verticilium genties grybams ir braškių miltligei, jautrus žiemos šalčiams (reikia apdengti!)

**Veislę išvedė:** Darbonne-Innotalis, Le Barp, Prancūzija

**Tėvai:** Elsanta x Polka, 1996 m.



### Be sėjomainos



**Veislė „Deluxe“ pasižymi skaniais vienodo dydžio uogomis.**

Vienu metu prisirpsta daug uogų, didžioji dauguma uogų yra 1 klasės, stiebai, ant kurių kabo uogos, yra ilgi, todėl uogos gerai matomos – ši savybė leidžia greitai priskinti daug uogų palyginus mažomis sąnaudomis. Deluxe veislės braškės duoda gerą derlių ir antraisiais derliaus rinkimo metais. Anksti pasodinus Frigo daigus, galima gauti gerą derlių.

Dėl didelių uogų Deluxe galima sodinti ir antrais metais.

Kadangi žiedkočiai išsikiša virš lapų, nerekomenduojame sodinti per anksti (vėlyvųjų šalų rizika!).

# Kimberly



Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

**Uogos:** didelės, vidutiniškai raudonos subalansuoto skonio uogos, ilgai išlieka šviežios

**Sunokimo laikas:** 2-3 dienomis anksčiau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** neatsparus deguliagrybiams ir Verticilium genties grybams

**Veislę išvedė:** Vissers, America, Nyderlandai

**Tėvai:** Gorella x Chandler, 1996 m.

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Elsanta



Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

**Uogos:** didelės, apvalios, nuo šviesiai raudonos iki raudonos spalvos, uogos vienodos ir tvirtos, vidutiniško skonio

**Sunokimo laikas:** priklausomai nuo oro ir dirvos, 23-24 kalendorinę savaitę

**Augalas:** labai geras derlius, jautrus žiemos šalčiams, neatsparus Verticilium genties grybams ir fitoftorai C.

**Veislę išvedė:** Plant Research International B. V., Wageningen, Nyderlandai

**Tėvai:** Gorella x Holiday, 1975 m.

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri





# Korona



**Uogos:** tamsiai raudonos, labai saldžios ir minkštos, vidutinio dydžio uogos

**Sunokimo laikas:** 0-1 diena vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** greitai auga (reikia vėlai sodinti!), antraisiais derliaus rinkimo metais uogos labai sumažėja, todėl primygtinai rekomenduojama imti derlių tik vienerius metus; neatsparus fitoftorai C ir kekerui

**Veislę išvedė:** Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlandai

**Tėvai:** Tamella x Induka, 1972 m.



## Be sėjomainos



# Sonata



**Uogos:** vidutinio tamsumo raudonos spalvos, blizgančios, apvalios, gero skonio uogos; ilgai išlieka šviežios, tačiau jautrios karščiui ir lietai.

**Sunokimo laikas:** 1-2 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** stiprus, krūmas nesuveša, duoda labai didelį derlių, neatsparus fitoftorai C ir kekerui, reikalauja daug magnio

**Veislę išvedė:** Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlandai

**Tėvai:** Elsanta x Polka, 2006 m.



## Be sėjomainos



# Elegance blizgančios, vienodos, tiesiog elegantiškos



**Uogos:** labai vienodos, blizgančios ir patrauklios, atitinka visus didmeninės prekybos reikalavimus, labai ilgai išlieka šviežios, atsparios lietai, uogos nelinkusios tamsėti

**Sunokimo laikas:** 3-4 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** auga statmenai, turi ilgus žiedkočius, todėl lengvai ir greitai nuskinamos; vienu metu prisirpsta daug uogų, jos **labai ilgai išlieka šviežios, galima greitai priskinti daug uogų**, todėl jos labiausiai tinka pardavimui tam tikru pageidaujamu metu.

**Veislę išvedė:** East Malling Research Ltd., Jungtinė Karalystė

**Tėvai:** East Malling Research Ltd., Jungtinė Karalystė



## Be sėjomainos



Braškių veislė Elegance duoda nuostabias, ypač vienodas, vidutinio dydžio uogas, kurios ilgai išlieka šviežios.

Tai, kad uogos ilgai išlieka šviežios, palengvina jų pardavimą.


Taip pat vertinama tai, jog vienu metu prisirpsta daug uogų, panašiai kaip Elsanta veislės braškės

Ilgų žiedkočių ir statmenų lapų dėka galima greitai pririnkti labai didelį kiekį uogų.

Elegance veislė neatspari miltligei, dėl to ji reikalauja daugi- au priežiūros ir atidumo.







Vidutinio ankstyvumo

## Konia Pirkėjai gali pramogauti, skindami uogas patys



**Uogos:** didelės ir labai didelės, blizgančios, kūgio formos uogos, atsparios krituliams, tačiau jautrios karščiui; skinant uogas atsiskiria taurėlapis (**lengva gaminti uogienę**)

**Sunokimo laikas:** 3-5 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** greitai auga ir intensyviai šaknijasi, todėl tinka dauginimui; turi ilgus žiedkočius, atsparus fitoftorai C ir Verticilium genties grybams, neatsparus braškių miltligei

**Veislę išvedė:** J. Putfarken, Hohenhorn, Vokietija

**Tėvai:** Elsanta x Calea, 1999 m.



Substratas



Šiltnamis



Dvigubas dengimas



Paprastas dengimas



Savalaikis derlius



Derliaus vėlinimas



60 dienų

### Be sėjomainos



**Konia yra kilusi iš Šlėzvigo-Holšteino žemės.**

Braškių veislę Konia vertinama dėl jos atsparumo dirvoje esančių ligų sukėlėjams. Šios veislės braškių skynimo laikotarpis yra ilgas, todėl ji tinkama auginti laukuose, kur pirkėjai uogas nusiskina patys.

Didelės ir labai didelės uogos nudžiugins klientus.

Konia veislės braškes reikia labai saugoti nuo braškių miltligės.



# Polka



**Uogos:** vidutinio dydžio, blizgančios, labai aromatingos, tamsus minkštimas

**Sunokimo laikas:** 4-6 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** auga vidutiniškai greitai, atsparus Verticilium genties grybams, **labai atsparus žiemos šalčiams**, neatsparus fitoftorai C

**Veislę išvedė:** Fresh Forward Holding B. V., Wageningen

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Salsa



**Uogos:** didelės, raudonai-oranžinės spalvos, su stačiais taurėlapiais, uogos paviršius minkštas, neatsparus lietu, subalansuotas skonis

**Sunokimo laikas:** 7-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** stiprus, greitais auga, atsparus Verticilium genties grybams ir fitoftorai C, neatsparus kekerui, lengvai ištvėria žiemos šalčius

**Veislę išvedė:** Fresh Forward Holding B. V., Wageningen, Nyderlandai, 1994 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Symphony



**Uogos:** vidutinio dydžio, vienodos, šiek tiek rūgštelėjusios uogos, ilgai išlieka šviežios, su didokais geltonais taškeliais, atsparios lietu, tačiau jautrios saulės spinduliams

**Sunokimo laikas:** 8-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** stiprus, gyvybingas augalas, atsparus fitoftorai F.

**Veislę išvedė:** SCRI

**Tėvai:** Rhapsody x Holiday, 1994 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Florence



**Uogos:** nuo raudonos iki tamsiai raudonos spalvos, didelės, sultingos; skonį pagerinti galima gausiau laistant

**Sunokimo laikas:** 7-10 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** labai sveika rūšis, reikalauja daug vandens, atsparus fitoftorai C, braškių mildligei ir Verticilium genties grybams, jautrus saulės spinduliams

**Veislę išvedė:** East Malling Research Ltd., Kent, Jungtinė Karalystė

**Tėvai:** [(Tioga x (Redgauntlet x (Wiltguard x Gorella))] x (Providence x Providence), 1997 m.

Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Savalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri



# Pandora



Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Sevalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

**Uogos:** vidutiniškai tamsios raudonos spalvos, vidutinio dydžio ir mažos uogos, labai geras saldokas skonis, minkštas paviršius ir minkštumas, jautrios karščiui ir lietai, rekomenduojamas dažnas skynimas!

**Sunokimo laikas:** 10-12 dienų vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** greitai auga, uogos lieka pasislėpusios po lapais; Pandora yra sterili, ji pati nesidaugina, dauginimuisi jai reikia kitos veislės su panašiu žydėjimo metu, pvz. Symphony arba Florence; atsparus Verticilium genties grybams ir fitoftorai C

**Veislę išvedė:** East Malling Research Ltd., East Malling, Jungtinė

**Tėvai:** (Von Humboldt x Redstar) x Merton Dawn, 1988 m.

Labai vėlyva

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri

# Malwina



Substratas

Šiltnamis

Dvigubas dengimas

Paprastas dengimas

Sevalaikis derlius

Derliaus vėlinimas

60 dienų

**Uogos:** tamsiai raudonos, šiek tiek rūgštelėjusio skonio

**Sunokimo laikas:** 20-22 dienomis vėliau, nei Elsanta veislės braškės

**Augalas:** greitai auga, gerai atlaiko žiemos šalčius, atsparus Verticilium genties grybams, neatsparus braškių miltligei, susodinusi (Frigo) daigus per mažais atstumais arba per anksti, nukenčia derliaus surinkimas.

**Veislę išvedė:** Selektion Peter Stoppel, Kressbronn, Vokietija

**Tėvai:** Sofie x Klon, 1998 m.

Labai vėlyva

## Be sėjomainos

toleruoja

jautri





# Motininiai augalai

Mūsų motininių augalų tėvai Frigo lauke auga atskiroje vietoje.

„Tėvai“ – tai in vitro padauginėti augalai. Keletas mūsų dauginamų veislių auga saugioje, apdengtoje aplinkoje.

Šiltnamyje augalai yra apsaugoti nuo virusų ir bakterijų.

Nepriklausomi Šlėzvigo-Holšteino Žemės ūkio rūmų kontrolieriai nuolat tikrina auginamas kultūras. Tai užtikrina nepriekaištingą augalų kokybę.



# Bandymų laukas

Kad savo klientams galėtume nuolat pasiūlyti naujų veislių, mes palaikome nuolatinius kontaktus su įvairiais selekcininkais visoje Europoje.

Visas naujienas mes pasodiname savo bandymų lauke, kad patikrintume jų tinkamumą įvairiems sodinimo ir platinimo metodams.

Mes kiekvienais metais kviečiame savo klientus į atvirų durų dieną, kurios metu supažindiname juos su naujomis veislėmis, augančiomis mūsų bandomuosiuose laukuose.





## Frigo daigai

Visas mūsų dauginamas veisles mes siūlome surūšiuotas sekančiais:

### Standartiniai daigai

**(Šaknų skersmuo – 6-8 mm)**

Tai mažiausias mūsų selekcionuotas dydis, daugiausiai naudojamas privačiuose daržuose ir soduose.

### A grupės daigai

**(Priklausomai nuo veislės, šaknų skersmuo – 8-12 arba 10-15mm)**

Tai dažniausiai sodinamas dydis. Kad daigas geriau vegetatyviai vystytųsi ir būtų geresnis derlius ateinančiais metais, rekomenduojama pirmaisiais metais leisti daigui pražysti.


### A+ grupės daigai

**(> 15 mm)**

Tai braškių daigai su labai dideliu vainiku ir daug užmegztų žiedų.

Šie daigai tinka braškėms, auginamoms atviram lauke arba šiltnamyje, kurių derlius turi būti surinktas pardavimui tam tikru pageidaujamu metu.

Šiuos stiprius daigus galima sodinti ir labai vėlai.



Standartiniai



A



A+

## Daigai vazonėliuose

Mes siūlome pasirinktų braškių veislių substrate ir lysvėse auginamas kultūras tokia forma:

### Daigai supresuotomis šaknimis

Skirti intensyviai sodinimui su maksimaliu derliumi:

- \* Substrate auginamoms kultūroms
- \* Lysvėse auginamoms kultūroms

Mūsų daigai turi 0,2 l talpos supresuotas šaknis.

Kuo didesnė šaknis, tuo geriau ir saugiau substrate vystosi augalas.

### Daigai vazonėliuose:

Daigai vazonėliuose daugiausiai naudojami intensyviai sodinimui substrate arba lysvėse. Priešingai nei daigai supresuotomis šaknimis, daigai vazonėliuose sodinami jau rugpjūtį ir kultivuojami iki sekančių derliaus rinkimo metų.

Mūsų daigai vazonėliuose turi **85 ccm** talpos šaknis ir gali būti sodinami rugpjūčio pradžioje.

Veislės pagal paklausimą!



Tray



# Užsakymai

Svarstote galimybę pradėti sodinti braškes?

Turite klausimų apie naujas braškių veisles arba sodinimo metodus?

Tuomet paskambinkite mums. Mes Jus mielai pakonsultuosime! Mes, kaip kompetetingi, ilgametę patirtį daigų ir uogų auginime turintys partneriai, padėsime Jums bet kuriuo metu.

☎ **+49 (0) 41 92-22 93**

**Nuo pirmadienio iki penktadienio 07.30-19.00 val.**

💻 **+49 (0) 41 92-24 91**

✉ **info@kaack-pflanzenvermehrung.de**

Jei turite galimybę, galite patys atsiimti užsakytus daigus. Jei ne, Jūsų pageidavimu transporto paslaugų įmonė laiku ir patikimai pristatys prekes į vietą.







Kaack Pflanzenvermehrung GmbH u. Co. KG

Osterfeld 11, 24649 Fulendorf

Tel.: +49 (0) 41 92/22 93 · Faks: +49 (0) 41 92/24 91

El. paštas: [info@kaack-pflanzenvermehrung.de](mailto:info@kaack-pflanzenvermehrung.de)

[www.kaack-pflanzenvermehrung.de](http://www.kaack-pflanzenvermehrung.de)